

Biozyma HFL



PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA BIOSTIMOLANTE

Estratti umici liquidi da leonardite

CARATTERISTICHE

Biozyma HFL è un prodotto con proprietà biostimolanti, derivato da estratti umici liquidi da leonardite. È progettato per dare maggiori risultati nelle fasi di germinazione, risveglio vegetativo e accrescimento (fioritura e allegazione). Aiuta le piante a sopportare condizioni avverse determinate da stress abiotici, favorisce lo sviluppo radicale (azione auxino-simile) e migliora l'assorbimento radicale dei nutrienti associati o presenti nel terreno. Favorisce e rivitalizza la struttura e la microflora nel terreno.

PUNTI DI FORZA

- Favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi
- Rivitalizza la microflora nel terreno
- Favorisce lo sviluppo radicale
- Aumenta e migliora le produzioni

DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

| COLTURA | APPLICAZIONE FOGLIARE | APPLICAZIONE FERTIRRIGAZIONE | PERIODO D'INTERVENTO | N° INTERVENTI |
|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| TAPPETO ERBOSO | 250-350 g/hl | 10-12 kg/ha | Risveglio vegetativo | 5-6 |
| ORTICOLE | 100-200 g/hl | 8-10 kg/ha | Varie fasi fenologiche | 3-4 |
| VITICOLE | 150-200 g/hl | 8-10 kg/ha | Varie fasi fenologiche | 3-4 |
| FLORICOLE | 150-200 g/hl | 6-8 kg/ha | Varie fasi vegetative | 2-3 |
| COLTURE INDUSTRIALI | 100-200 g/hl | 8-10 kg/ha | Varie fasi fenologiche | 2-3 |

PERIODO DI APPLICAZIONE

| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

COMPOSIZIONE % P/P

- Carbonio (C) umico sul tal quale 12%
- Carbonio (C) fulvico sul tal quale 3%
- Azoto (N) organico sulla sostanza secca 0,8%

FORMULAZIONE

Liquida

PROPRIETÀ FISICO CHIMICHE

- pH: 5,3 • Densità: 1,20 g/ml
- Rapporto C/N: 43
- Grado di umificazione: 80%



AVVERTENZE

Distribuire solo nelle ore più fresche della giornata. Si consiglia di integrare con **Aminofort N+C** e trattare ogni 20-30 giorni dal risveglio vegetativo o dalla semina-impianto.

CONFEZIONI

250g - 500g - 1kg - 2,5kg - 5kg - 10kg - 20kg

